

Už pri vydávaní prvej sklačky s najznámejšími a najrozšírenejšími inváznymi druhami boli jej autori rozhodnuti postupne verejnosti približovať najčastejšie sa vyskytujúce nepôvodné (cudzokrajné) druhy rastlín, ktoré sa na území Slovenska nekontrolované šíria a tým poškodzujú našu prírodu. Svojím inváznym spávaním vytĺáčajú z pôvodných stanovišť naše domáce druhy rastlín a ich spoločenstvá, čím sa znižuje druhová diverzita jednotlivých typov vegetácie.

Pretože informácií o skupine inváznych rastlín nie je stále medzi verejnosťou dostatok, prinášame aj v 3. sklačke údaje nielen o vzhľade ďalších vybraných inváznych rastlín, ale aj stručné poznatky o ich spôsobe šírenia, o ich zastúpení na Slovensku, ale i nezádúcom vplyve na prírodu a možnostiach ich ničenia.

Prostredníctvom sklačky chceme apelovať na milovníkov ako aj na pestovateľov rastlín, aby skôr, než sihnu po ďalšej okrasnej, alebo i menej známej kultúrnej rastline dobre sa oboznámili s miestom jej pôvodu a základnými biologickými a ekologickými vlastnosťami.

Skúsenosti s rozširovaním nepôvodných druhov rastlín nám poskytujú veľa príkladov, kedy aj atraktívna alebo hospodársky zaujímavá rastlina môže zapríčiniť ľahko riešiteľný problém. Veľa razy sme svedkom toho, keď v parku alebo v okrasnej záhradke postupne osídľujú takéto druhy stále väčší priestor a vytĺáčajú z neho ostatné pestované druhy. Ešte horšie je, ak sa takýto na prvý pohľad neškodný druh dostane mimo vymedzeného areálu, pretože vtedy sa časom z neho stáva doslova nepriateľ pre okolitú prírodu a krajinu.

RUDBEKIA STRAPATÁ (RUDBECKIA LACINIATA L.)

čeľad: astrovité (Asteraceae)

Trváca rastlina pôvodom zo Sev. Ameriky. K jej rozšíreniu prispelo pestovanie v parkoch a záhradách.

Dorastá až do výšky 250 cm. Biele sú priame, hore rozkonárené. Listy sú dole jednoduché a hore 2x perovito strihané. Najdekoratívnejšou časťou sú zlatozlté kvety s veľkými úbormi (\varnothing 7-12 cm) so žltozeleným alebo červenohnedým terčom. Kvitne od júla do októbra.

Na stanovišťa nie je náročná. Často rastie v blízkosti vodných tokov, v lužných lesoch, okolo vodných nádrží, na násypoch železničných tratí.

Pribuzným druhom je rудbekia srstnatá (*Rudbeckia hirta*), s výškou asi 1m, s chudobne rozvetvenou štetinatou byľou v hornej časti s nedelenými listami. Terč je polguľovitý vypuklý čierno až červenohnedý.

Oba druhy vytĺáčajú pôvodnú vegetáciu. Ich šíreniu možno zabrániť mechanickým ničením porastov ešte pred rozkvitnutím, čím sa obmedzí produkcia semien.



ASTRA KOPIJOVITOLISTÁ (ASTER LANCEOLATUS Wild.)

syn: *Aster salicifolius*, Lamk. nom Scholler, *A. frutetorum*, Wimm., *A. lamarckianus* Aschers. et Graeb., non Nees
čeľad: astrovité (Asteraceae)



Pochádza z východnej Ameriky. Pôvodne pestovaná ako okrasný druh v záhradkách.

Rastliny s výškou 60 -120cm charakterizuje plazivý výbežkatý podzemok, vzpriamene biele v hornej časti rozkonárené s kopijovitými sediacimi listami a bledožalovými kvetmi so žltým terčom usporiadanými v úboroch (\varnothing 15mm). Kvitne v auguste až októbri.

Rozširuje sa pomocou plazivých výbežkatých husto rozkonárených podzemkov. Rastie na rumoviskách, skládkach, okrajoch ciest, v pobrežných krovinách potokov a riek. Plošné zárasty vytvára aj v medzihrádzových priestoroch lužných lesov.

Pribuznými druhami sú *Aster novi-belgii*, *A. patulus*, *A. laevis*, *A. tradescantii* a ich križence, ktoré sa postupne rozširujú a časom môžu plošnými zárastami vytlačiť domáce rastlinstvo.

JEŽATEC LAŁOČNATÝ (ECHINOCYSTIS LOBATA Michx.fil.)

Torr. et A. Gray
Syn.: *Echinocystis echinata* (Muhl. ex Willd.) Britton, Sterns et Poggenb., *Momordica echinata* Muhl. ex Willd., *Sicyos lobata* F. Michx.
čeľad: tekvicovité (Cucurbitaceae)



Ježatec lałočnatý bol k nám dovezený začiatkom 20. stor. ako okrasná rastlina zo Severnej Ameriky.

Táto jednorčná, jednodomá popínava rastlina (liana) býva dlhá aj 8 m. Má holú byľ s 3 - 7 dlaňovito lałočnatými na báze srdcovitými listami svetlozelenej farby. Samičie kvety sú usporiadane v metlinách, samičie kvety sú jednotlivé v pazuchách listov. Sú zelenkasto-biele a objavujú sa v júli - septembri. Najnápadnejšou časťou tejto byliny je plod v podobe vajcovitej, dlho ostranej, zelenej alebo žltej bobule s priemerom do 5 cm.

Výraznejšie je rozšírený na vlhkých stanovištiach, rumoviskách, v priekopách, ale najmä v sprivednej vegetácii tokov a v lemoch lužných lesov, kde často vytvára nepriehodné súvislé zárasty. Pomocou rozkonárených úponkov sa dokáže vyšplhať až do korún stromov.

Predstavuje vážnu hrozbu pre pôvodné ekosystémy.

AMBRÓZIA PALINOLISTÁ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.)

syn: *Ambrosia elatior* L.
čeľad: astrovité (Asteraceae)



Jednorčná alergénna burina pôvodom zo Sev. Ameriky. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v najteplejších južných oblastiach.

Dorastá do výšky od 10 - 200cm. Má priamu chlpatú alebo plstrnatú bohatu rozkonárenú byľ. Listy sú jednoducho až 3x perovito strihané, na líci tmavozelené, na rubu sivozelené pritlačene chlpaté. Bledožlté kvety sú jednopohlavné, usporiadane v úboroch. Kvitne od augusta do októbra. Plodom je nažka. Priemerná rastlina vytvorí viac ako 2000 plodov.

Rastie na rumoviskách, skládkach, železničných násypoch a na obrábaných poliach.

Pribuzným druhom s rovnakým pôvodom a vlastnosťami je ambrózia trojzárezová (*Ambrosia trifida* L.), ktorá je zatiaľ na Slovensku zriedkavá a rastie len na 2 lokalitách Vých. Slovenska.

Najúčinnejšie odstraňovanie spočíva vo vytrhaní rastlín zo zeme aj s koreňmi. V prípade plošného výskytu je účinné skosenie pred zakvitnutím rastlín.

RORIPOVNÍK VÝCHODNÝ (BUNIAS ORIENTALIS L.)

Syn.: *Laelia orientalis* (L.) Desv.
čeľad: kapustovité (Brassicaceae)



Roripovník východný má pôvod v juhovýchodnej Ázii (v Arménsku). Prvý údaj o jeho výskytu na Slovensku pochádza z južného Slovenska zo 60. rokov 20. storočia.

Je to 2-ročná až trváca, 120 cm vysoká bylina. Byľ je v hornej polovici bohatu rozkonárená, žliazkatá. Listy prízemnej ružice sú zvyčajne lýrovité alebo gracovité, perovito lałočnaté, byľové listy sú kopijovité, lałočnaté a zúbkaté. Kvitne v máji až v auguste, žlté kvety sú v hustých, rozkonárených strapcoch. Plod je nepukavá šešuľka.

Osiľuje hlavne synantropné stanovišťa, cestné a železničné násypy, prekládkové stanice, prístavy, okolia skladov, rumoviská a ī.


Jeho výskyt ešte nie je masový. Vhodná starostlivosť o stanovišťa, na ktorých sa vyskytuje, ako aj jeho likvidácia by mohli zamedziť inváznemu šíreniu.

Vydala Štátnej ochrany prírody SR, Banská Bystrica v roku 2007 ako tretie vydanie.


Text: RNDr. Alžbeta Cвachová, RNDr. Ema Gojdicová, RNDr. Marta Nižnánská, Mgr. Eva Pieštorová, Mgr. Andrea Ruščančinová.

Foto a odborná spolupráca: doc. RNDr. Viera Feráková, CSc., RNDr. Eva Uherčíková, CSc., Ing. Ján Terray, RNDr. Ondrej Ľavoda, CSc., RNDr. Marica Zalíberová, CSc., **Jaz. úprava:** PaeDr. L. Liptáková, CSc. **Náklad:** 4 000 výtlačkov.


JEŽATEC LALOČNATÝ



RORIPOVNÍK VÝCHODNÝ



AMBRÓZIA PALINOLISTÁ



ASTRA KOPIJOVITOLISTÁ

INVÁZNE DRUHY RASTLÍN NA SLOVENSKU 3



RUDBEKIA STRAPATÁ



ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

BANSKÁ BYSTRICA